



Kako brinuti o sebi za vrijeme zračenja glave i vrata

JELO I PIĆE

Vaš dijetetičar će Vam pomoći oko prehrane i unosa pića

- Birajte visokoproteinsku, visokokaloričnu hranu i pića
 - Sir, mlijeko, meso, jaja, grah, jogurt, pudinzi i sladoled
- Birajte meku ili usitnjenu hranu ukoliko imate bolove ili poteškoće prilikom žvakanja ili gutanja uobičajene hrane
 - Krem juhe, variva, složenci, tjestenina, kajgana i pire krumpir
 - Dodajte umake, preljeve, ulje ili maslac kako biste omekšali hranu
- Izbjegavajte kiselu hranu i tekućine poput rajčice, naranče ili grejpa
- Izbjegavajte suhu, tvrdnu i hrskavu hranu poput tosta, oraha, čipsa i sirovo voće i povrće
- Jedite više manjih obroka ili užina tijekom dana ukoliko hranjenje postane otežano
- Uzimajte dodatke prehrani i/ili miksane napitke na bazi voća/povrća ili mlijeka
- Nastojte popiti 8 čaša negazirane tekućine svakodnevno (bezalkoholne i beskofeinske)
- Uzimajte češće manje zalogaje hrane i gutljaje tekućine kako biste olakšali gutanje
- Promjena okusa je normalna. Raspitajte se kako poboljšati okus hrane.

Ukoliko imate problema sa prehranom ili gubitkom tjelesne težine, odmah obavijestite svoj liječnički tim

GUTANJE

Vaš logoped je Vam pomoći oko gutanja za vrijeme liječenja

Praćenje gutanja i promjena prehrane

- Nastavite slijediti smjernice za sigurno gutanje (Vidi stranicu "Prije zračenja")

Vježbe gutanja

- Nastavite s vježbama najbolje što možete dok traje liječenje
- Ponavljajte svaku vježbu 5-10 puta, 3 puta na dan

Utjecaj zračenja na gutanje

Nakon 2. tjedna zračenja gutanje Vam može postati otežano zbog nuspojava zračenja. Te promjene mogu potrajati do nekoliko tjedana nakon završetka zračenja. Ni slučajno nemojte zbog tih tegoba pauzirati zračenje. Ako se zračenje privremeno prekine, njegov učinak nije isti kao zračenje koje se primi u redovitom slijedu. Pitajte stomatologa specijalista oralne medicine da vam pomognе smanjiti bolove u ustima bez prekida zračenja.

- Možete imati osjećaj kao da Vaša usta/grlo žare prilikom gutanja; možete zamijetiti i promjenu osjeta okusa i mirisa
- Možete osjećati da su Vam usta suha. Nosite sa sobom bocu s vodom i često uzmite gutljaj

Nadležni stomatolog specijalist oralne medicine koji je u kontaktu s onkološkim timom pomoći će Vam oko njege usne šupljine tijekom liječenja

Upotreba zubnog konca

- Ukoliko možete, koristite Zubni konac barem jedanput dnevno
- Koristite otopinu ili gel anestetika lidokaina prije korištenja Zubnog konca, ukoliko je to potrebno

Četkanje

- Koristite otopinu ili gel anestetika lidokaina prije četkanja zubi
- Koristite meku četkicu i Zubnu pastu s fluoridima (u Hrvatskoj je dostupna pasta koja sadrži 1400 ppm fluora i takvu je pastu najbolje nabaviti, ili iz inozemstva pastu s 5000 ppm fluora)
 - Za čišćenje usta, koristite čistu vlažnu gazu ili vatrirani štapići natopljeni otopinom za ispiranje usta
 - Ako ne možete podnijeti pastu za zube, upotrebljavajte otopinu sode bikarbone

Ispiranje (vidi "Recept za blagu otopinu za ispiranje usta" i "Korištenje udilaga za fluoridaciju" na početku)

- Isperite, mučkajte i pljunate otopinu nekoliko puta nakon četkanja zubi, čišćenja Zubnim koncem i nakon jela
 - Dok ste budni, ispirite usta svakih 1-2 sata
- Upotrebljavajte udilage za fluoridaciju svakodnevno i koristite fluoridiranu Zubnu pastu kako bi se sprječio nastanak karijesa zuba
- Za gustu sluz, češće koristite otopinu za ispiranje usta i ispirite vodom

Vlaženje usne šupljine

- Nosne dišne puteve preko noći vlažite sobnim ovlaživačima zraka
- Ovlažite često usnu šupljinu otopinama za vlaženje usta i lubrikantima na bazi vode
 - Izbjegavajte proizvode na bazi vazelin i glicerina

Njega usnica

- Upotrebljavajte lubrikantna sredstva topljiva u vodi, na bazi voska ili ulja
- Nemojte koristiti vazelin

Tim koji provodi liječenje zračenjem pomoći će Vam oko njege kože za vrijeme liječenja

Vaša koža može se činiti suha, zategnuta, može svrbiti, biti crvena i natečena

- Nastavite brinuti o Vašoj koži prema ranijim savjetima (vidi stranicu "Prije zračenja")
- 4 puta dnevno koristite losione za tijelo ili kreme bez mirisa, na bazi vode
- Nemojte ljuštiti olabavljenu kožu, grepsti ili trljati kožu

Obavijestite Vaš tim zdravstvenih djelatnika ako Vam koža puca ili postane vlažna ili svrbi

- Nastavite prati se blagim sapunom i toplim vodom. Područje zatim posušite nježnim tapkanjem
- Liječnik može preporučiti kremu za Vašu kožu
- Možete koristiti komprese natopljene u fiziološkoj otopini i do 4 puta dnevno

Ukoliko imate bilo kakvih poteškoća sa stomom, odmah obavijestite o tome bilo koga iz svog zdravstvenog tima.

Možda ćete dobiti sondu. Vaš dijetetičar i tim zdravstvenog osoblja potruditi će se pomoći Vam u svladavanju ishrane putem sonde i u održavanju sonde. Dvije su vrste sonde: nazogastrična (kroz nos) i perkutana endoskopska gastrostoma (kroz kožu trbuha).

Prehrana putem sonde

- Nastavite ispirati sondu za hranjenje vodom dva puta dnevno (vidi preporuke "Prije zračenja")
- Ukoliko ste izgubili na težini, ili ste uzimali manje hrane i tekućine na usta, Vaš dijetetičar će poraditi sa vama na tome i počet će pratiti kako se hranite putem sonde
- Uzimajte vodu i dodajte prehrani prema savjetu Vašeg nutricionista

Održavanje sonde

- Nastavite održavati kožu oko sonde čistom i suhom
- Ako nema iscjedaka, prestanite koristiti zavoj
- Provjeravajte oko sonde znakove crvenila, osjetljivosti, lošeg mirisa i znakove infekcije
 - Znakovi infekcije: koža vatreno crvene boje, oticanje, iscjedak, bol ili povisena tjelesna temperatura

Odmah obavijestite zdravstveni tim ukoliko...

- ... mislite da imate infekciju ili probleme sa sondom (bilo da je sonda kroz nos ili kroz kožu trbuha).
- ... se graničnik (gumeni/plastični dio oko sonde prislonjen uz kožu) čini preuskim ili preširokim (odnosi se na sondu kroz kožu trbuha)

PREHRANA PUTEM SONDE I ODRŽAVANJE SONDE



Go online for all resources
in multiple languages.

Visit ISOO.World

Njega usne šupljine

RECEPT ZA BLAGU OTOPINU ZA ISPIRANJE USNE ŠUPLJINE



1 čajna žličica
(5 ml) soli



1 čajna žličica (5 ml)
sode bikarbonate



4 čaše
(1 l) vode

KAKO NAPRAVITI OTOPINU ZA ISPIRANJE USNE ŠUPLJINE

1. Pomiješajte 1 čajnu žličicu sode bikarbonate i 1 čajnu žličicu soli s 4 čaše vode
2. Stavite otopinu u posudu s poklopcom
3. Otopina treba biti čuvana na sobnoj temperaturi
4. Na kraju svakog dana bacite ostatak otopine i napravite novu

KAKO KORISTITI OTOPINU

- Dobro protresite prije upotrebe
- Mućkajte i grgljavite jednu jušnu žlicu (15 ml) i potom ispljunite
- Ponovite 2 do 3 puta prilikom svake upotrebe
- Koristite otopinu svaka dva sata tijekom dana

HIGIJENA PROTEZA

- Držite proteze izvan usne šupljine što je više moguće
- Uklonite proteze, ploče i nadomjestke prije četkanja
- Četkajte i ispirite proteze nakon jela i prije spavanja
- Stavite proteze u otopinu za čišćenje tijekom najmanje 8 sati
- Ukoliko uzimate lijek protiv gljivica u ustima, stavite protezu u otopinu s tim lijekom

UPUTE ZA KORIŠTENJE UDLAGA ZA FLUORIDACIJU

1. Prije stavljanja udlaga, operite zube četkicom i zubnim koncem
2. Utore udlaga ispunite gelom do 1/3. Pitajte stomatologa specijalista oralne medicine koji gel je najbolje koristiti.
3. Stavite udlagu i ispljunite višak gela
4. Ostavite udlagu u ustima 5 minuta
 - Koristite prije spavanja za dugotrajnije rezultate
 - Nakon svake upotrebe udlage očetkajte i osušite ih na zraku
 - Nemojte koristiti vruću vodu za čišćenje udlaga (vruća voda će iskriviti udlagu)
 - Nakon uporabe udlaga za fluoridaciju, tijekom 30 minuta nemojte piti, jesti niti ispirati usta

Ukoliko više ne možete koristiti svoje udlage za fluoridaciju o tome obavijestite svoj stomatološki tim

VAŽNE BILJEŠKE O VAŠOJ SKRBI: